

SELEKCIJSKI KRITERIJUMI U ORGANSKOM STOČARSTVU*
SELECTION CRITERIA IN ORGANIC CATTLE BREEDING

Savić Mila, Dimitrijević V., Trailović Ružica, Vegara M., Dimitrijević B., Bečkei Ž., Petrujkić B., Cojkić A.**

Centralno pitanje u procesu organizovanja organskog stočarstva je poznавање специфичности овог вида производње, добро познавање карактеристика раса (конституције, отпорности, изражене предиспозиције према pojedinim оболjenjima, производних својстава). Иstraživački центри су у сарадњи са производаџима дефинисали битне особине на којима се заснивају селекцијски програми у органској сточарству. Важна чинјеница за ветеринарску службу је да се селекцијски програми у органској сточарству првенствено заснивају на favorизовању здравих животиња, отпорних, добрих репродуктивних карактеристика, које дugo могу да се гаје у производном систему. Специфична отпорност и адаптираност аутонотних раса на услове средине представљају важан селекцијски критеријум.

Kључне речи: органско сточарство, отпорност, расе говеда, расе оваци и коза

Uvod / Introduction

Tokom dužeg perioda proučavaju se negativni efekti intenzivne konvencionalne poljoprivredne производње на здравље људи и животиња, при čemu je posebna паžnja usmerena na negativne efekte хемизације земљишта инерционалне употребе антибиотика. На почетку 21. века у све већој мери долазе до израžaja негативни ефекти конвеницијалне полјопривреде на агробиодиверзитет и глобалне климатске промене, што потврђује мултидисципларни приступ у решавању проблема (Ellis i sar., 2012). У том смислу у стратегији Организације за храну и полјопривреду (FAO), која се односи на производњу хране до 2050. године, у циљу revitalizације природних ре-

* Rad primljen за штампу 03. 07. 2013. године

** Dr sc. vet. med. Mila Savić, redovni професор, dr sc. vet. med. Vladimir Dimitrijević, docent; dr sc. vet. med. Ružica Trailović, docent, Fakultet veterinarske medicine, Универзитет у Београду; dr sc. Mensur Vegara, redovni професор, Departement of International Environment and Development Studies, Norwegian University of Life Science; dr sc. vet. med. Blagoje Dimitrijević, docent, dr sc. vet. med. Žolt Bečkei, асистент, dr sc. vet. med. Branislav Petrujkić, docent, Aleksandar Cojkić, dvm, istraživac saradnik Fakultet veterinarske medicine, Универзитет у Београду

sursa, značajno mesto ima favorizovanje organske poljoprivrede i samoodrživih sistema (IFOAM 2010, Pilling i sar., 2011).

U toku protekle dve decenije beleži se značajan rast organske proizvodnje u stočarstvu. Na svetskom tržištu potražnja za mlekom i mesom, ovčijim i koznjim sirom, kao i vunom iz organske proizvodnje, značajno se povećava iz godine u godinu. Rezultati ispitivanja vršenih tokom 2012. godine u evropskim zemljama pokazuju da organska proizvodnja mleka pokazuje stalni rast (Production and Commercialization of Organic Milk in Europe). Najveća proizvodnja organskog mleka je u Nemačkoj (600.000 t), zatim u Danskoj (478.000 t) i Austriji (431.000 t). Rezultati ove analize takođe ističu odnos cena mleka iz organske i konvencionalne proizvodnje, kao ključni element u odluci proizvođača da pristupi procesu konverzije iz konvencionalne u organsku proizvodnju.

Rezultati dosadašnjih ispitivanja u zemljama sa razvijenom organskom proizvodnjom ukazuju na brojne probleme koji prate organizovanje ovog vida proizvodnje, kao što su uspostavljanje samodrživih farmi, proces konverzije i dr. Centralno pitanje u procesu organizovanja organskog stočarstva je poznavanje specifičnosti ovog vida proizvodnje, dobro poznavanje karakteristika rasa (konstitucije, otpornosti, izražene predispozicije prema pojedinim oboljenjima, proizvodnih svojstava). Na osnovu izvršene procene biraju se pogodne rase za uzgoj u datom organskom sistemu. Naime, veći broj studija je pokazao da pojedine rase, koje u intenzivnim uslovima konvencionalne proizvodnje postižu odlične rezultate, nisu u stanju da ostvare puni proizvodni potencijal u uslovima organske proizvodnje. U uslovima organskog gajenja rase ispoljavaju specifične karakteristike. Sve analize ukazuju na to da se u osnovi uspešnog organizovanja organske proizvodnje nalazi proučavanje interakcije „rasa x uslovi sredine“, pri čemu se ističe značaj adaptiranosti koju ispoljavaju autohtone rase (Nauta, 2009).

Strategija za unapređenje rasa u organskom uzgoju zasniva se na primeni klasičnih principa selekcije u čistoj rasi i primeni metoda ukrštanja. Istraživački centri su u saradnji sa proizvođačima definisali bitne osobine na kojima se zasnivaju seleksijski programi u organskom stočarstvu (Van Diepen i sar., 2007). Važna činjenica za veterinarsku službu je da se seleksijski programi u organskom stočarstvu prvenstveno zasnivaju na favorizovanju zdravih životinja, dobrih reproduktivnih karakteristika, koje dugo mogu da se gajte u proizvodnom sistemu. Specifična adaptiranost je takođe važan seleksijski kriterijum (Jovanović i sar., 2009, 2011; Savić i sar., 2007).

Kriterijumi za izbor rasa goveda pogodnih za organsku proizvodnju mleka / Criteria for choice of cattle breeds proper for organic milk production

Dosadašnji rezultati istraživanja pokazali su da izbor rasa za organsku proizvodnju mleka zahteva dobar uvid u karakteristike zdravlja i proizvodne osobine rase. Među najvažnijim osobinama, koje rase goveda treba da imaju u organskom sistemu proizvodnje mleka, ističu se dobre reproduktivne karakteristike, lako

telenje, otpornost, dobro zdravlje vimena (konformacija vimena, rezistencija prema mastitisu) i dužina iskorišćavanja jedinki. Na listi seleksijskih kriterijuma nalaze se i osobine koje se odnose na proizvodna svojstva: količina mleka po laktaciji, sadržaj proteina i masti u mleku, konverzija hrane. Nakon ovih svojstava, na listi seleksijskih kriterijuma, pažnja se ponovo usmerava na karakteristike zdravlja i otpornosti jedinke, kao što su čvrstina i otpornost ekstremiteta, osetljivost na parazitske infekcije, "robustnost jedinki" (snažna konstitucija) i temperament (Klocke, 2012).

Na osnovu ispitivanja vršenih u pojedinim regionima u kojima organska proizvodnja mleka ima dugu tradiciju, može da se zaključi da je u osnovi uspešne organske proizvodnje organizovanje organskog sistema u skladu sa specifičnim uslovima regiona. Isti značaj ima i izbor rase, koja pod datim uslovima u organskom sistemu može da odgovori na brojne izazove, odnosno da ispolji proizvodni potencijal na najbolji način. U tom smislu do izražaja dolazi favorizovanje tradicionalnih rasa adaptiranih na uslove gajenja (De Haas i sar., 2012).

U intenzivnoj, specijalizovanoj proizvodnji najčešće se gaji holštajn rasa i melezi sa otpornijim rasama kao što su američka smeđa rasa i monbeliar. Takođe, dobri rezultati se postižu i gajenjem frizijske rase, gernzej i ejšir rase. Za gajenje u organskim uslovima veoma su pogodni melezi nastali ukrštajem holštajn i džerzej rase. Mnoge studije ističu značaj kombinovanih rasa za organsku proizvodnju mleka (Verkamp, 2013).

Analiza zdravstvenog stanja i najčešćih bolesti koje se javljaju u organskoj proizvodnji, pokazuje da pojava mastitisa i poremećaji u reprodukciji predstavljaju najveće zdravstvene probleme koji otežavaju organizovanje organske proizvodnje mleka (Brinkman i sar., 2012; Penedo i sar., 2012). U tom smislu selekcija kralja mlečnog proizvodnog tipa prvenstveno je usmerena na favorizovanje otpornih jedinki i zdravlje vimena.

Kriterijumi za izbor rasa goveda pogodnih za organsku proizvodnju mesa / Criteria for choice of cattle breeds proper for organic milk production

Kao osnovni kriterijumi pri izboru rase za organsku proizvodnju mesa procenjenju se težina telenja, konverzija hrane, kvalitet mesa, predispozicija za pojavu mastitisa i oboljenja ekstremiteta. U organskoj proizvodnji mesa koriste se specijalizovane rase goveda, koje su zbog izrazitih tovnih karakteristika i dobrih aklimatizacionih sposobnosti široko rasprostranjene u svetu. Praksa je pokazala da hereford, limuzin, šarole i belgijska plava rasa i u uslovima organske proizvodnje postižu odlične rezultate. U pojedinim regionima sa specifičnim, često vrlo nepovoljnim uslovima lokalne rase, imaju selektivnu prednost. Među najbolje primere uspešne organske proizvodnje mesa zasnovane na tradicionalnim rasama je gajenje aberdin angus rase, koja na najbolji način doprinosi široj promociji regiona.

Kriterijumi za izbor rasa ovaca i koza pogodnih za organski uzgoj /

Criteria for choice of sheep and goat suitable for organic production

Organska proizvodnja u ovčarstvu je u najvećoj meri usmerena ka proizvodnji mesa. U ovčarskoj proizvodnji je u velikoj meri izražena razlika u veličini farme i sistemu gajenja koji se primenjuje. Kriterijumi za izbor su dobre tovne sposobnosti (brzo postizanje optimalne telesne mase jagnjadi za plasman na tržištu), dobre reproduktivne karakteristike, otpornost prema zaraznoj šepavosti i parazitskim infekcijama. Rezultati ispitivanja pokazuju da su teksel, safolk i šarole rasa veoma pogodne za uzgoj u organskim sistemima za proizvodnju mesa. U Nemačkoj jagnjad virtemberg rase u organskoj proizvodnji na paši i kombinovanom sistemu takođe postižu dobre rezultate.

U Evropi organska proizvodnja u kozarstvu ima najveći rast u oblastima koje su tradicionalno orijentisane na uzgoj koza: Italija, Grčka, Francuska, Španija i Velika Britanija (Lua i sar., 2010). Imajući u vidu visoku cenu organskog mleka interesovanje za ovaj vid proizvodnje je sve aktuelnije. Ispitivanja vršena u Nemačkoj pokazuju da visokoproduktivne rase kao što alpina (Alpine German Brown) u uslovima organske proizvodnje postiže dobre rezultate (Rahmann i sar., 2006, 2009). Rezultati ispitivanja pokazuju da burska rasa, koja se odlikuje izraženim tovnim sposobnostima i u organskim sistemima postiže dobre rezultate. Jedan od primera gde autohtone rase imaju selektivnu prednost u organskom sistemu gajenja je lokalna pajoja rasa, koja je dobro adaptirana na nepovoljne uslove gajenja u oblasti andaluzijskih planina (Acosta i sar., 2009).

Generalno se može reći da sva ispitivanja najčešćih problema u organizovanju organske proizvodnje ovaca i koza ukazuju da je najteža implementacija standarda koji se odnose na veterinarski nadzor. Kao najveći problem ističe se kontrola parazitskih infekcija (Rahmann i sar., 2006; Taylor i sar., 2012). Takođe se ističe značaj pravilne primene mera prevencije, kao i neophodnost integrisnog pristupa u kontroli parazitskih infekcija.

Zaključak / Conclusion

U cilju razvoja organske proizvodnje u stočarstvu, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, aktivno se uključio u proces edukacije iz oblasti organske proizvodnje, kao i u istraživanja mogućnosti za razvoj ovog vida proizvodnje u različitim regionima Srbije. Dosadašnji rezultati procene prirodnih resursa, ekoloških faktora i animalnih genetičkih resursa pokazali su da su pojedini brdsko-planinski regioni kao što su Sjenica i Stara planina, pogodni za organizovanje animalne organske proizvodnje (Savić i sar., 2013a; Savić i sar., 2013b). Imajući u vidu evolutivnu adaptiranost pramenke na uslove gajenja u brdsko-planinskom regionu Balkana, vrši se procena pogodnosti pojedinih sojeva pramenke za gajenje u organskim sistemima (Savić i sar., 2012; Dimitrijević 2013).

NAPOMENA / ACKNOWLEDGEMENT:

Rad je finansiran sredstvima projekta Ministarstva nauke Republike Srbije TP 31085 i HERD Project no.: 09/1548, 332160 UÅ.

The work is funded by Ministry of Science of the Republic of Serbia TP 31085 and HERD Project no.: 09/1548, 332160 UÅ.

Literatura / References

1. Acosta JM, Castel JM, Guzman J, Ligero M, Mena Y, Nahed J. Organic and conventional dairy goat production systems in Andalusian mountainous areas. In: Pacheco F. (ed.), Morand-Fehr P. (ed.). Changes in sheep and goat farming systems at the beginning of the 21st century : research, tools, methods and initiatives in favour of a sustainable development. Zaragoza: CIHEAM / DRAP-Norte / FAO. 2009: 253-6.
2. Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management Department. Production and commercialization of organic milk in Europe, 2011: 1-7.
3. Brinkmann J, March S, Barth K, Bioland D, Isselstein J, Klocke D, et al. Health improvement following interdisciplinary intervention in organic dairy farms. In: Abstract book of 27th World buiatrics congress, Lisbon, Portugal, 3-8 June 2012: 53.
4. De Haas Y, Smolders AA, Hoorneman JN, Nauta WJ, Veerkamp RF. Suitability of crossbred cows for organic farms based on crossbreeding on production and functional traits. Cambridge Journals Online, 2012.
5. Dimitrijević B. Ispitivanje mogućnosti korišćenja izoenzimskih oblika superoksid dismutaze 1 kao biomarkera intenziteta parazitskih infekcija kod ovaca. Doktorska disertacija, 2013.
6. IFOAM. Organic food and farming: A system approach to meet the sustainability challenge ed IF-OAM EU GROUP. 2010.
7. Jovanović S, Savić M, Živković D. Genetic variation in diseases resistance among farm animals. Biotechnology in animal husbandry 2009; 25(5-6): 339-47.
8. Jovanović S, Savić M, Aleksić S, Živković D. Production standards and the quality of milk and meat products from cattle and sheep raised in sustainable production systems. Biotechnology in Animal Husbandry 2011; 27 (3): 397-404.
9. Klocke D. Health improvement following interdisciplinary intervention in organic dairy farms, Abstract book, 27th World buiatrics congress, Lisbon, Portugal, 3-8 June 2012: 54.
10. Lua CD, Gangyib X, Kawasc JR. Organic goat production, processing and marketing: Opportunities, challenges and outlook, Small Ruminant Research 2010č 102'9.
11. Nauta WJ. Selective Breeding in Organic Dairy Production. Thesis. Wageningen University 2009; 1-160.
12. Pilling D, Hoffmann I. Climate change and animal genetic resources for food and agriculture, state of knowledge: risks and opportunities. FAO Commission on genetic resources for food and agriculture, 2011.
13. Pendo BI, Mork M, Nordqvist M, Fall N. Health status of Swedish organic and conventional dairy herds. In: Abstract book of 27th World buiatrics congress. Lisbon, Portugal, 3-8 June 2012. 54.
14. Rahmann G, Seip H. Alternative strategies to prevent and control endoparasite diseases in organic sheep and goat farming systems – a review of current scientific knowledge, Ressortforschung für den Ökologischen Landbau 2006: 49-90.
15. Rahmann G. Goat milk production under organic farming standards, Tropical and Subtropical Agroecosystems 2009; 11: 105-8.
16. Savić M, Dimitrijević B, Borozan S, Katić Radivojević S, Jovanović S. The determination of the preferable sheep breed for organic production in the hilly-mountainous region, In: Abstract book of 27th World buiatrics congress Lisbon, Portugal, 3-8 June 2012, 252-3.

17. Savić M, Vučković S, Jovanović S. Prilog sagledavanju potencijala prorodnih resursa sjeničko pešterske visoravni za organizovanje organske ovčarske proizvodnje. Vet glasnik 2013; 67(1-2): 97-104.
18. Savić M, Vegara M, Vučković S, Prodanović S, Dimitrijević B. Importance of Zackel sheep for conservation of biodiversity at Sjenica-Pester plateau. In: Abstract book of 64 Annual Meeting EAAP 2013, Nantes, France, 26-30 August, 2013.
19. Savić M, Jovanović S, Vegara M. Stočarstvo, Univerzitet u Beogradu, Norwegian University of Life Sciences 2007; 1-304.
20. Taylor M. Practical guidelines promoting sustainable control of helminth parasites for sheep and cattle—the UK experience, Keynote lectures 27th World buiatrics congress Lisbon, Portugal, 3-8 June 2012, 102-5.
21. Van Dirpen P, Mc Lean B, Frost D. Livestock breeds and organic farming systems. Report 2007, ADAS Pwllpeiran.
22. Veerkamp RF. Suitability of crossbred cows for organic farms based on crossbreeding on production and functional traits. Animal 2013; 7(4): 655-65.

ENGLISH

SELECTION CRITERIA IN ORGANIC CATTLE BREEDING

Savić Mila, Dimitrijević Vladimir, Trailović Ružica, Vegara Mensur, Dimitrijević B., Bećkei Ž., Petrujkić B., Cojkić A.

The central issue in process of organizing organic cattle breeding is the knowledge about specificities of this kind of production, good knowledge of breed characteristics (body composition, immune tolerance, expressed predisposition towards some diseases, production properties). Research centres, in collaboration with producers, have defined the essential features on which the selection programmes in organic cattle breeding are based on. Of the greatest importance for veterinary service is the fact that selection programmes in organic cattle breeding are in the first place based on giving priority to healthy animals, with strong immune system, good reproductive characteristics, which can be in production system for a long period. Additional important selective criteria is specific body resistance and adaptability of autochthonous breeds to environmental conditions.

Key words: organic cattle breeding, body resistance, cattle, sheep and goat breeds.

РУССКИЙ

СЕЛЕКЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ В ОРГАНИЧЕСКОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Мила Савич, В. Димитриевич, Ружица Траилович, М. Вегара, Б. Димитриевич, Ж. Бечкеи, Б. Петруйкич, А. Цойкич

Центральным вопросом в процессе организации органического животноводства является понимание специфики этого вида производства, хорошее знание характеристик пород (конституция, сопротивляемость, выраженная предрасположенность к отдельным заболеваниям, производительные качества). Иссле-

довательские центры в сотрудничестве с производством определили важнейшие характеристики, которые легли в основу селекционных программ в органическом животноводстве. Важным фактом в работе ветеринарной службы в органическом животноводстве является то, что селекционные программы в органическом животноводстве преимущественно основываются на предпочтении здоровых животных, с хорошей сопротивляемостью и высокими репродуктивными характеристиками, которые могут длительно использоваться в системе производства. Специфическая сопротивляемость местных пород и их способность адаптироваться к условиям среды представляют собой важный селекционный критерий.

Ключевые слова: органическое животноводство, сопротивляемость, породы крупного рогатого скота, породы овец и коз